

ALMOGRAN (Almotriptan)

BRUKSOMRÅDER OG EFFEKTER

| Vanlige bruksområder | Effekter |
|---|--|
| Akutte anfall av migrene med eller uten aura. | Nyere kunnskap om migrenens patofysiologi har vist at triptanene sannsynligvis reduserer utskillelsen av CGRP under migreaneanfall. Sammentrekningen av hjernes blodkar viser seg i nyere studier å være neglisjerbar. |

BIVIRKNINGER

Tabellen angir et utvalg vanlige eller alvorlige bivirkninger, og indikerer når bivirkningene vanligvis inntreer og hvordan de kan håndteres. For mer informasjon om bivirkninger, se SPC og Legemiddelhandboka.

Enkelte av symptomene som er rapportert som bivirkninger kan være en del av selve migreaneanfallet.

| Bivirkning | Inntreer | Egenomsorg | Lege | Kommentar |
|---------------------|--------------------------------|------------|------|--|
| Kvalme/oppkast | Når som helst under behandling | | ● | Ved alvorlig kvalme bør lege kontaktes for å vurdere behandling og tiltak. |
| Svimmelhet | Når som helst under behandling | | ● | Vær forsiktig ved bilkjøring |
| Søvnhighet/tretthet | Når som helst under behandling | | ● | Vær forsiktig ved bilkjøring |

Symbolforklaring:

● Behov for legekontakt vurderes ut ifra alvorlighetsgrad

▲ Pasienten bør kontakte lege for vurdering

⚠ Kontakt lege umiddelbart, Ring 113

PRAKTISK BRUK

| | Tabletter |
|-----------------------------------|--|
| Inntak Tidspunkt og mat | Start ved første tegn på migrenehodepine, men er også effektiv når den tar i en senere fase. Tas uavhengig av mat. |
| Svelgevansker | |
| Andre råd | Anbefalt dose er 1 tablett. Det kan gis ytterligere 1 dose dersom symptomene dukker opp igjen innen 24 timer. Det må gå minst 2 timer mellom de 2 dosene. Anbefalt maks. dose er 2 tabletter pr. døgn. Triptaner bør generelt ikke tas mer enn 8-10 dager i måneden pga. fare for å utvikle medikamentoverforbrukshodepine (MOH). |

INTERAKSJONER

Tabellen angir noen nærings- nytelses- eller legemidler som kan påvirke effekten eller bivirkninger av almotriptan. Vær oppmerksom på disse ved råd om egenomsorg

| Nærings-, nytelses- eller legemiddel | Legemiddel som kan påvirkes | Konsekvens |
|--------------------------------------|--|---|
| Ergotamin | Selektive serotonin (5HT1) agonister NO2C C (triptaner) | - Økt risiko for perifer vasokonstriksjon og ergotisme. - Inntak av et triptan og ergotamin bør kun skje etter et tidsintervall på minst 24 timer. |
| Reseptbelagte legemidler | Ved spørsmål om interaksjoner med reseptbelagte legemidler, se interaksjonsdatabase. | |