

# EMGALITY (Galkanezumab)

**Indikasjon:** Migrene hos voksne med 4 anfall eller mer per måned

**Refusjon:** Individuell refusjon etter søknad av nevrolog eller barnelege til pasienter med diagnosen Kronisk migrene som har forsøkt minst tre andre forebyggende medikamenter uten effekt eller med bivirkninger.

## BRUKSOMRÅDER OG EFFEKTER

Vanlige bruksområder	Effekter
Forebyggende behandling av migrene.	Emgality er et monoklonalt antistoff som fungerer ved å binde seg til selve peptidet CGRP uten å binde seg til reseptoren. Vi vet at CGRP øker under et migreaneanfall. Emgality hemmer den biologiske effekten av CGRP og dermed også smerten ved migrene, sannsynligvis ved modulering av trigeminus systemet.

## BIVIRKNINGER

Tabellen angir et utvalg vanlige eller alvorlige bivirkninger, og indikerer når bivirkningene vanligvis inntreer og hvordan de kan håndteres. For mer informasjon om bivirkninger, se SPC og Legemiddelhåndboka.

Bivirkning	Inntreer	Egenomsorg	Lege	Kommentar
Forstoppelse	Når som helst under behandlingen	Lindring/forebygging: Ikke-medikamentelle tiltak, volumøkende midler, osmotisk virkende midler, sennaglykosider, klyster	●	
Reaksjoner på injeksjonsstedet	Innen et par dager etter injeksjon		●	Milde og oftest forbigående
Kløe, utslett	Når som helst under behandling		●	
Svimmelhet	Når som helst under behandling		●	
Anafylaktisk reaksjon			▲	

### Symbolforklaring:

- Behov for legekontakt vurderes ut ifra alvorlighetsgrad      ▲ Pasienten bør kontakte lege for vurdering      ▲ Kontakt lege umiddelbart, Ring 113

Emgality er på den europeiske overvåkingslisten fordi man trenger mer informasjon om bivirkninger. Det betyr at alle mistenkte bivirkninger skal meldes inn. Meldeskjema ligger på <https://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet>

## PRAKTISK BRUK

Tabellen angir noen råd for å optimalisere pasientens etterlevelse.

	Injeksjon
<b>Inntak</b> Tidspunkt	240 mg (to injeksjoner à 120 mg) ved oppstart, deretter 120 mg én gang i måneden. Til selvinjeksjon etter opplæring.
<b>Administrering</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sprit av huden før injisering.</li><li>- Hele innholdet skal injiseres i underhuden i magen, låret, baksiden av overarmen eller i seteområdet, se pakningsvedlegget.</li><li>- Injeksjonsstedene skal byttes på, og skal ikke settes i områder hvor huden er øm, har blåmerker, er rød eller hard. Etter opplæring kan pasienten selv administrere ved å følge bruksanvisningen.</li><li>- Kast sprøyten i en gul kanylebøtte eller på annen forsvarlig måte.</li></ul>
<b>Glemt dose</b>	Pasienten bør rådes til å injisere glemt dose så snart som mulig, og deretter fortsette med dosering én gang i måneden.
<b>Andre råd</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Til engangsbruk</li><li>- Skal ikke ristes</li><li>- Oppbevares i kjøleskap i 2-8 grader Celsius</li><li>- Bør være i romtemperatur minst 30 min før injisering</li><li>- Kan oppbevares i inntil 30 grader Celsius i en enkelt periode på inntil 7 dager</li><li>- Skal destrueres om den har vært i ute av kjøleskap &gt;7 dager</li><li>- Beskyttes mot direkte sollys</li><li>- Sjekkes visuelt før bruk. Skal ikke injiseres hvis uklart, tydelig gul eller inneholder flak eller partikler.</li><li>- Tilby abonnement</li></ul>

## INTERAKSJONER

Det er ingen kjente interaksjoner med Emgality og måten Emgality virker i kroppen gjør det lite sannsynlig med interaksjoner.