

M


D

P


Direktoratet for
medisinske produkter

Nytt om legemidler

Advarsler om samtidig bruk av slankelegemiddelet Mysimba (bupropion-naltrekson) og opioider forsterkes. Rasjonering av Mucomyst inhalasjonsvæske (acetylcystein) og Ozempic (semaglutid).



Europeiske legemiddelmyndigheter (EMA) forsterker nå sine advarsler om interaksjoner mellom Mysimba og legemidler som inneholder opioider. Mysimba bør ikke brukes av pasienter som får behandling med opioider.



Mysimba (bupropion-naltrekson) er godkjent for behandling av overvekt hos voksne, og skal brukes i kombinasjon med kalorifattig kosthold og fysisk aktivitet.

Opioider vil ikke fungere effektivt hos pasienter som tar Mysimba, fordi virkestoffet naltrekson blokkerer effekten. Det er også risiko for sjeldne, men svært alvorlige bivirkninger som krampeanfoll og serotonergt syndrom når Mysimba brukes sammen med opioider og antidepressiva.

De regionale legemiddelinformasjonsentrene (RELIS) har mottatt flere meldinger om bivirkninger fra helsepersonell, både om psykiske bivirkninger, krampeanfoll og smerter på grunn av manglende analgetisk effekt av opioider (1).

Sterkere advarsel

Europeiske legemiddelmyndigheter (EMA) forsterker nå sine advarsler om interaksjoner mellom Mysimba og legemidler som inneholder opioider (2).

- Mysimba bør ikke brukes av pasienter som behandles med opioider.
- Pasienter må advares mot manglende effekt av opioider ved samtidig behandling med Mysimba.
- Ved planlagt kirurgi bør Mysimba seponeres minst tre dager i forveien.

Sjekkliste og pasientkort

For leger er det allerede etablert en sjekkliste for forskrivning som minner om kontraindikasjoner, og tilstander hos pasienten som gir høyere risiko for bivirkninger. Pakningen vil nå i tillegg inkludere et kort som minner pasienten om å informere helsepersonell om at de bruker Mysimba.

Referanser:

1. <https://relis.no/artikler/42746/>
2. <https://www.ema.europa.eu/en/news/updated-advice-mini-mise-risks-interaction-between-weight-loss-medicine-mysimba-opioids>

Rasjonering

Mucomyst inhalasjonsvæske

Det er mangel på Mucomyst (acetylcystein) inhalasjonsvæske og rasjonering er innført for å sikre tilgangen til pasienter som har størst behov.

Mucomyst inhalasjonsvæske er kritisk viktig i behandling av paracetamolforgiftninger for å hindre leverskade. Den slimløsende effekten er dårligere dokumentert, og mange pasienter kan ha like god nytte av inhalasjon av saltvann, acetylcystein brusetabletter og andre slimløsende tiltak. DMP oppfordrer derfor til restriktiv bruk av Mucomyst inhalasjonsvæske som slimløsende behandling i primærhelsetjenesten.

Rasjoneringen innebærer at apotek:

- kun skal utlevere på blå resept eller rekvisisjon fra institusjoner, for eksempel sykehjem
- ikke skal utlevere for mer enn fire ukers bruk om gangen på blå resept

Ozempic (semaglutid)

Det er fortsatt rasjonering på hvit resept. Etterspørsel og leveranse til Norge har stabilisert seg slik at det ikke lenger er behov for å begrense utleveringen til diabetespasienter på blå resept. Utleveringen kan derfor skje i henhold til det som står på resepten, og ikke begrenses til fire uker.